



МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Medical University - Sofia

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Faculty of Medicine – Deans's Office

София, Бул. "Св. Георги Софийски" 1,
София 1431, тел. (02)9521046; факс 02)9520337

"St. G. Sofiysky" blvd. 1, Sofia 1431
tel. +359(2)9521046; fax+359(2)9520337

ЗАПОВЕД

№ ЗД- 78/01.04.2022 г..

На основание чл. 26, ал. 9, т. 1 от ЗВО, във връзка със заповед №РК 36-527/31.03.2022 г.
на Ректора на МУ-София

НАРЕЖДАМ:

I. Възстановява се провеждането на присъствен учебен процес (лекции, упражнения, преддипломен стаж, изпити и други форми на обучение) в структурните звена на Медицински факултет считано от 04.04.2022 г.

1. Заверката на учебния процес (семестър/цикъл/стаж) да се извършва служебно от учебните отдели на Деканата след представени списъци от ръководителите на катедри, удостоверяващи посещаемостта на студентите.

1.1. Списъците, удостоверяващи посещаемостта на студентите на цикъл/стаж да се представят в учебните отдели на Деканата в последния учебен ден на цикъла/стажа.

2. В клиничните бази на университетските болници, в които все още не е възстановена възможността за присъствено обучение, занятията да се провеждат в електронна среда - присъствено.

II. За осигуряване на безопасност и здраве при работа, се препоръчва на ръководителите на структурни звена в Медицински факултет на МУ-София да планират и провеждат организационни мероприятия и да предприемат действия за превенция на риска от разпространение на COVID-19 (съгласно Приложения 1,2 и 3):

1. Редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения.
2. Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкуса и др.)
3. Инструктаж на служителите за правилна хигиена на ръцете.
4. Носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба.
5. Осигуряване на дозатор с дезинфектант за ръце на входа на помещенията и по коридорите.
6. Използване на информационните и комуникационни технологии за предоставяне на услуги в електронна среда.

III. Настоящата заповед отменя заповед № 3Д - 66/23.03.2022 г.

IV. Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководителите катедри, заместник-деканите, ръководителите на отдели и сектори, административния ръководител на МБК, студентите, специализантите, докторантите, отговорник по ЗБУТ и всички служители, и да се публикува на официалната страница на Медицински Факултет, МУ-София.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на ръководителите катедри, заместник деканите, административния ръководител на МБК, ръководителите на учебните отдели и отговорник по ЗБУТ.



**ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР БУЛАНОВ, ДМ
ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ**

Приложения:

1. Приложение № 1 - Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение;
2. Приложение №2 Инструкции за правилна хигиена на ръцете;
3. Приложение №3 Инструкция за правилно носене на лицева маска.

Приложение № 1

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на разпространение на COVID-19:

1. Избор на дезинфектант
 - 1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.
 - 1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с хrани и фуражи“.
 - 1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.
 - 1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при пократко време на въздействие (до 15 минути).

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките
 - 2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бура, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).
 - 2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.
 - 2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

3. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, като директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1 .1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3. 3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваниите дезинфекции кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Приложение № 2

Инструкции за правилна хигиена на ръцете:

1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

е) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен.

2. Ръцете се мият най-малко 20 секунди с вода и сапун.

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на пашите, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение №3

Инструкция за правилно носене на лицева маска:

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.

2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.

3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) и се избягва докосването на предната ѝ страна.

4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
 - а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °C за не по-малко от 20 минути; или
 - б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).
7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.